

 Rumah Sakit Unhas	PROSEDUR PENGAMBILAN SAMPEL KULTUR CAIRAN CAPD		
	Nomor Dokumen 5225/UN4.24/OT.01.00/2022	Nomor Revisi 0	Halaman 1/3
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR UNIT DIALISIS	Tanggal Terbit 13 Juni 2022	 Ditetapkan, Direktur Utama, Dr. dr. Saiful Mawardi Tadjuddin Chalid, Sp. OG (K) NIP. 196704091996012001	
Pengertian	Prosedur pengambilan sampel kultur cairan CAPD mengambil proses pengambilan cairan peritoneal dialisis pada pasien yang diduga mengalami peritonitis yang ditandai dengan cairan drain keruh dan atau nyeri perut		
Tujuan	Sebagai acuan yang seragam dalam hal pengambilan sampel kultur cairan CAPD yang bertujuan untuk mengidentifikasi bakteri penyebab peritonitis sehingga dapat dilakukan pemberian terapi tepat dan efektif		
Kebijakan	Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor 91/UN4.24/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Dialisis di Rumah Sakit Unhas.		
Prosedur	- Persiapan Alat - Spuet 10 cc 2 buah - Tabung specimen 1 buah - Botol bactec kultur 1 buah - Alkohol swab secukupnya - Sarung tangan - Masker - Ultra clamp - Tempat sampah infeksi dan non infeksi - Memberikan salam kepada pasien dan memperkenalkan diri - Mengidentifikasi pasien dengan benar dan memvalidasi kondisi pasien - Membuat kontrak waktu dengan pasien - Menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan pada pasien keluarga - Mencuci tangan 6 langkah - Membawa semua peralatan ke dekat pasien - Mengatur posisi pasien untuk pergantian cairan - Menggunakan masker		



Rumah Sakit Unhas

PROSEDUR PENGAMBILAN SAMPEL KULTUR CAIRAN CAPD

Nomor Dokumen

5225/UN4.24/OT.01.00/2022

Nomor Revisi

0

Halaman

1/3

10. Mencuci tangan dengan handrub
11. Melakukan pergantian cairan sesuai spo, mengeluarkan seluruh cairan dari rongga perut kemudian masukkan cairan dianeal baru kedalam rongga perut, lalu lepas konektor dan tutup transfer set dengan minicap
12. Tutup konektor dengan pull ring/ penutup hijau, klem dibawah konektor
13. Kantong drain in diletakkan dibawah dan kantong drain out diletakkan diatas sampai cairan habis kemudian bolak balik cairan dalam kantong drain in (Sampel cairan CAPD yang dikirim, telah disimpan minimal 2 jam dalam peritoneum)
14. Menggunakan sarung tangan
15. Letakkan cairan dimeja usapkan alkohol swab pada karet injeksi ambil cairan 10cc dengan spuit masukkan kedalam botol bactec, selanjutnya usapkan alkohol swab pada karet injeksi ambil 10 cc cairan masukkan ke dalam tabung specimen, kirim ke laboratorium mikrobiologi
16. Setiap ditemukan adanya peritonitis CAPD maka setelah kultur diambil segera memulai terapi intra peritoneal sambil menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut
17. Sampaikan kepada pasien bahwa tindakan telah selesai dilakukan
18. Merapikan pasien dan alat
19. Membuang sampah sesuai jenis nya
20. Melepaskan sarung tangan dan masker
21. Mencuci tangan 6 langkah
22. Dokumentasi di lembar terintegrasi

Unit Terkait

1. Unit Hemodialisis
2. Instalasi Gawat Darurat
3. Instalasi Rawat Jalan
4. Instalasi Rawat Inap
5. Instalasi Farmasi

 Rumah Sakit Unhas	PROSEDUR PENGAMBILAN SAMPEL KULTUR CAIRAN CAPD		
	Nomor Dokumen 5225/UN4.24/OT.01.00/2022	Nomor Revisi 0	Halaman 1/3
Dokumen Terkait	Catatan Terintegrasi Rekam Medik		
Petugas Terkait	1. Staf Hemodialisis 2. Staf Instalasi Rawat Darurat 3. Staf Instalasi Rawat Jalan 4. Staf Instalasi Rawat Inap 5. Staff Instalasi Farmasi		